

Rana común

(*Pelophylax perezi*)

Texto: Enrique García Gómez

Fotografías: Foto Ardeidas

Coloración variada

Es una de las ranas de tamaño mediano, pudiendo llegar a los 10 centímetros las hembras y a los 8 los machos, aunque lo normal es que la media esté unos tres centímetros por debajo de estas medidas. La coloración dorsal puede variar mucho de unos ejemplares a otros, si bien lo habitual es que tenga un fondo verde, con diferentes intensidades según individuos, punteado con manchas negras. En las extremidades, especialmente en las patas traseras, el negro se suele presentar en forma de líneas anchas, irregulares y transversales.

Ibérica por antonomasia

El área de distribución natural se centra en la península ibérica, aunque también está en el sur de Francia. Debido a introducciones, en la actualidad se puede localizar en los diferentes archipiélagos de nuestro entorno: Canarias, Baleares, Azores y Madeira. La limitación principal en su distribución, una vez que esté en una zona con presencia de agua, es la altitud, pues no tolera las condiciones de alta montaña.



Poco delicada

Su exigencia fundamental está en la presencia más o menos constante de agua, pues se separa escasos metros de esta. Prefiere aguas permanentes, aunque no es infrecuente su presencia en masas con cierta temporalidad. Además, evita aguas muy frías y riberas densamente cubiertas de vegetación. Por lo demás, es una especie todoterreno. Vive en aguas fluyentes y en aguas estancadas, incluso en charcas ganaderas. Se encuentra en hábitat bien conservados y en zonas muy alteradas, siendo de los primeros anfibios en ocupar zonas húmedas muy modificadas o de nueva creación (tras roturaciones, incendios, obras públicas...) y no tiene problema en colonizar masas de agua artificiales. Habita en entornos naturales más o menos aislados y en zonas urbanas con mucha proximidad al ser humano. Aunque lo normal sería encontrarla en aguas limpias y dulces, tolera relativamente bien aguas con cierto grado de contaminación y aguas salobres.

Huevos a tutiplén

El periodo reproductor de la rana común es muy amplio, pues puede tener lugar desde abril hasta julio, dependiendo de las localidades. Las hembras, que suelen alcanzar la madurez sexual con un año de edad, desovan normalmente más de 2000 huevos, que eclosionan en torno a la semana. Tal cantidad de huevos se pueden encontrar adheridos al sustrato, a la vegetación o flotando en el agua.

