JARDÍN BUTÁNICO SIR SEEWQQSASUR RANGOQUANITARIA



José González Granados Ingeniero Técnico Forestal





La ruta tradicional que se hace en el Jardín Botánico de Sir Seewoosagur Ramgoolam comienza por un pequeño sendero transversal, la avenida Poivre, bordeado de gigantescas palmeras reales (Roystonea regia y R. oleracea), que se diferencian por un ensanchamiento en la parte superior del estípite de la primera. A la derecha nos topamos con flora del continente australiano, como el pino de Queensland (Agathis robusta) y dos grandes araucarias (Araucaria heterophylla). También a la derecha se pueden ver un árbol de ayoyote (Thevetia peruviana), una planta de la familia de las Apocináceas de origen americano, mientras que a la izquierda observamos el cedro de las Bermudas (Juniperus bermudiana), una especie de conífera rara y muy poco conocida, el árbol de la Jaca (Artocarpus heterophyllus), morácea originaria de Indonesia, y el denominado árbol helecho (Felicium decipines). Otras especies son: palma de azúcar (Arenga obtusifolia), Dipterocarpus alatus, pino de Cook o de Nueva Caledonia (Araucaria columnaris), caoba (Swietenia macrophylla) y caoba bastarda (Andira inermis), rafia (Raphia farinifera), Albizia caribaea, originaria de Centroamérica, y Agathis robusta y A. parmerstonii, ambas especies endémicas de Australia.






(Polyalthia longifolia)

En el lado opuesto de la avenida de Poivre, después de pasar la avenida Telfair, los siguientes árboles están casi en fila: manzano malayo (Syzygium malaccense), árbol de las linternas (Hernandia nymphaeifolia), Mimusops máxima, endemismo de Mauricio, árbol orquídea rojo (Bauhinia galpinii), árbol del sándalo (Santalum album), caliandra (Calliandra surinamensis), candelillo (Senna spectabilis), palma de cola de pes-


















lmendro Indio (Terminalia

A lo lejos se oye el correr del agua como un murmullo; se trata del río Limón, que pasa por debajo del engalanado puente de los suspiros, lugar de referencia donde nos podemos sentar en un pequeño jardín en el que se mezclan florestas de Oriente, como el árbol de la canela (*Cinnamomum zeylanicum*), la teca (*Tectona grandis*) y el almendro indio (*Terminalia catappa*). Aquí, no solo contemplamos la naturaleza, ¡la respiramos!; el olfato nos deleita con un intenso desfile de perfumes procedentes de distintas flores, frutas maduras y especias que nos trasladan al espacio dimensional de los aromas. A pocos pasos, ya en la avenida d'Epinay, hay un bosque de bambúes amarillos de la India (*Bambusa vulgaris*). Los brotes jóvenes se usan como verdura y se consumen en gran parte de Asia. En el cruce de las avenidas Telfair y Cossigny se abren en abanico, como pavos reales, las hercúleas palmeras Talipot (*Corypha umbraculifera*). También se puede admirar aquí la palmera princesa (*Dictyosperma album*) y la palmera azul de Mauricio (*Latania loddigesii*).











Hibiscus liliiflorus de flor amarilla








Corypha umbraculifera fue descrita por Carlos Linneo en su obra Species Plantarum. Es una palmera unicaule y monocárpica, originaria de la India y Sri Lanka, cuyos ejemplares viven entre 30 y 80 años y pueden alcanzar los 25 m de altura. Sus enormes hojas pueden llegar a medir más de 7 m de diámetro (las más anchas entre las palmeras), con

un grueso peciolo que supera los 4 m de largo. Llegado el momento emite una panícula terminal de más de 6 m de alto (la inflorescencia más grande del reino vegetal), muy densa y ramificada, con millones de flores de color crema. Los frutos, de color verde, tienen forma esférica y maduran a los doce meses de la floración (tras lo cual, la planta muere). Otras palmeras


presentes en la avenida Telfair son la palmera reina originaria de Brasil (Syagrus romanzoffiana), cuya sinonimia es Cocos plumosa, la palmera de Palmira (Borassus flabellifer) y la palmera de las Seychelles (Deckenia nobilis).

Tras atravesar la avenida Cossigny se descubre la columna de Liénard, obelisco cuadrangular de mármol blanco en el que están grabados los nombres de las personas que han contribuido a la prosperidad de Isla Mauricio, y a la protección de su flora y fauna. Se debe resaltar una cita del botánico francés Bernardin de Saint-Pierre grabada en una de sus caras: "El regalo de una planta útil me parece más precioso que el descubrimiento de una mina de oro, y un monumento más duradero que una pirámide". Más adelante nos topamos con un antiguo modelo de una fábrica de azúcar construido por la Cámara de Agricultura de Mauricio en 1953. Es una réplica de los primeros ingenios azucareros con cilindros verticales tirados por bueyes.










Reanudamos nuestro recorrido, a pesar del exacerbado calor tropical en el cenit del día, entre un paisaje de cuento de hadas. Súbitamente, a lo lejos, aparece el castillo de Mon Plaisir. Este edificio fue construido por los ingleses a mediados del siglo XIX y se usa en la actualidad para recibir a invitados y personalidades en las ceremonias oficiales. Indira Gandhi, la princesa Margarita de Inglaterra, François Mitterrand o el mismo Nelson Mandela, entre otros personajes notables, tuvieron el privilegio de plantar "su" árbol frente a este castillo. Siguiendo la avenida Mon Plaisir, después de un pequeño puente, descubrimos una gigantesca y centenaria higuera sagrada (Ficus religiosa). Este jardín botánico cuenta con ocho especies diferentes del género Ficus. Enseguida aparecen islas cubiertas de exuberante vegetación, con palmeras, papiros y árboles del viajero, y una estatua de Bernardin de Saint-Pierre, autor de la trágica y famosa novela Paul et Virginie, nombre que recibe la calle que se encuentra al final de la avenida.





Otras especies destacables de este jardín botánico son: árbol de sangre (Corymbia calophylla), árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora), coco de mar (Lodoicea maldivica), la planta que tiene la semilla más grande del reino vegetal, palmera blanca (Bismarckia nobilis) y ébano de Mauricio (Diospyros tessellaria). Como ya se ha comentado, Sir Seewoosagur Ramgoolam es, de hecho, un "palmetum" a gran escala, con más de ochenta especies de palmeras, muchas de ellas endémicas de las islas Mascareñas. Algunos géneros que pueden observarse aquí son: Acanthophoenix, Adonidia, Borassus, Calamus, Caryota, Chamaedora, Chrysalidocarpus, Cocos, Corypha, Cyrtostachys, Dictyosperma, Euterpe, Hyophobe, Latania, Licuala, Livistona, Lodoicea, Phoenix, Ptychosperma, Raphia, Rhapis, Roystonea, Thrinax, Verschaffeltia y Zalacca.































Las plantas de Mauricio, sacudidas durante milenios por ciclones y evolucionadas en ausencia de herbívoros, muestran algunas adaptaciones inusuales a la vida en un bosque, cuya estructura presenta una alta densidad de árboles y un dosel bajo con ramas que se entrelazan a modo de escudo contra el viento. Los árboles aquí están anclados al suelo por raíces con for-



ma y disposición de contrafuerte. Algunas especies son polinizadas por aves, reptiles o algunos insectos. Las flores son grandes, producen mucho néctar y, a menudo, salen directamente del tronco (flores caulinares). La dispersión de sus semillas, en ausencia de mamíferos durante miles de años, fue realizada por dodos, eslizones y tortugas gigantes que comían la fruta escupiendo las semillas o la tragaban entera. Por eso, muchas especies de árboles y arbustos producen frutas grandes, carnosas y de colores brillantes con una semilla dura dentro, como sucede con los géneros *Diospyros* y *Sideroxylon*, entre otros.

En este vergel botánico existe un rincón donde pueden ser contemplados algunos animales como ciervos (*Cervus timorensis*) y tortugas (*Aldabrachelys gigantea*). Los murciélagos, como el denominado zorro volador de Mauricio (*Pteropus niger*), único mamífero endémico que queda en la isla, pueden ser vistos colgando de las copas de los árboles durante el día. El jardín también cuenta con varias especies de aves como loros, patos y la gallineta de Madagascar (*Gallinula chloropus* subsp. *pyrrhorrhoa*). Un ave que regularmente hace las delicias de los visitantes al cazar pequeños peces sobre los nenúfares gigantes es la pequeña garza de Mauricio (*Butorides striata* subsp. *rutenbergi*). Entre los invertebrados es fácil observar, libando entre las flores, a *Papilio demodocus* y *Papilio manlius*.















84 @**RevForesta** 2018. N.º 70










Dentro de los estanques se pueden ver varios animales acuáticos como la rana mascareña (*Rana mascariensis*), el sapo pantera (*Bufo regularis*), introducido desde EE. UU., y peces como los guppy (*Lebistes reticulatus*), el pez cola de espada (*Xiphiphous hellerii*) o las anguilas, todos ellos foráneos de la isla. También es posible ver reptiles como el gecko diurno de Mauricio (*Phelsuma ornata*), el gecko de cola azul (*Phelsuma cepediana*) y el gecko del bosque de tierras bajas de Mauricio (*Phelsuma guimbeaui*); y es frecuente el camaleón (*Calotes versicolor*). Los gecónidos son el principal alimento de una culebra de hábitos nocturnos conocida como serpiente lobo de la India (*Lycodon aulicus*), accidentalmente introducida en estas islas del océano Índico.

Aldabrachelys gigantea es una especie de tortuga de la familia Testudinidae que solo habita en el archipiélago de las Islas Seychelles. Después de la tortuga gigante de las Galápagos es la tortuga más grande del mundo, pudiendo sobrepasar el metro de longitud. Los machos pueden llegar a pesar 250 kg y vivir más de 150 años.

Además del Jardín Botánico de Sir Seewoosagur Ramgoolam, otras atracciones turísticas importantes de Mauricio son la cascada y la Tierra de los Siete Colores, ambas ubicadas en Chamarel. La Tierra de los Siete Colores presenta dunas de color rojo, marrón, violeta, verde, azul, púrpura y amarillo, formadas por roca volcánica rica en diferentes minerales; concretamente contienen hierro (responsable del color rojo) y aluminio (responsable del color azul/púrpura). Como particularidad, los montículos no se ven afectados por la erosión de las lluvias tropicales de la isla.




PLANTAS EN PELIGRO CRÍTICO EN MAURICIO			
Astelia hemichrysa	Compositae	Mauricio y Reunión	
Badula crassa	Myrsinaceae	Mauricio y Reunión	
Barleria observatrix	Acanthaceae	Mauricio	
Chassalia boryana	Rubiaceae	Mauricio	
Eugenia bojeri	Myrtaceae	Mauricio	
Gouania tiliifolia	Rhamnaceae	Mauricio	
Helichrysum mauritianum	Compositae	Mauricio	
Ochrosia borbonica	Apocynaceae	Mauricio y Reunión	



Los dibujos, láminas y pliegos de herbario elaborados por botánicos, sobre todo a partir del siglo XVIII, han sido claves en la documentación de plantas que se creían extintas. En 1877, un botánico europeo que estudiaba la flora de las islas de Mauricio y Rodrigues hizo un dibujo del café marrón (Ramosmania rodriguesii), última vez que se documentó esta planta, y que definitivamente fue dada por extinta en los años 40 del siglo XX. En 1980, un profesor de biología que daba clase a niños de 12 años encomendó a sus alumnos la recolección de flores y hojas con el fin de enseñarles la flora de las islas con la sorpresa de que un estudiante llevó a clase una rama del último ejemplar vivo de esta especie de arbusto. El español Carlos Magdalena, jardinero del Real Jardín Botánico de Kew, apodado El Mesías de las plantas, ha hecho posible el "milagro" de salvar a este taxón de la extinción a partir del último ejemplar de su especie. También ha rescatado de la desaparición al nenúfar más pequeño de la Tierra (Nymphaea thermarum). Entre otros ejemplos semejantes, es notorio el caso de Rhaphidospora cavernarum y Teucrium ajugaceum, plantas no citadas en Australia desde 1873 y 1891 respectivamente, y "redescubiertas" en el siglo XXI; o el hallazgo de una nueva especie de Araucariaceae en Australia, perteneciente a un género que hasta mediados de los años 90 se creía extinguido en el Jurásico cuando, en realidad unos cuarenta ejemplares crecían en parque nacional de Wollemi -de ahí su denominación pino de Wollemi (Wolemia nobilis)-.











86 @RevForesta 2018. N.º 70













PLANTAS INVASORAS EN MAURICIO			
Acacia nilotica	Leguminosae	África	
Albizia lebbeck	Leguminosae	Asia	
Ardicia crenata	Myrsinaceae	Este de Asia	
Callistemon citrinus	Myrtaceae	Australia	
Cinnamomum camphora	Laureaceae	Japón	
Delonix regia	Leguminosae	Madagascar	
Furcraea foetida	Agavaceae	Centroamérica	
Haematoxyum campechianum	Leguminosae	México	
Hedychium coronarium	Zingiberaceae	Himalaya	
Hiptage benghalensis	Malpighiaceae	India y Malasia	
Homalanthus populifolius	Euphorbiaceae	Asia	
Lantana camara	Verbenaceae	Brasil	
Lucaena leucocephala	Leguminosae	América tropical	
Ligustrum robustum var. walkeri	Oleaceae	Sri Lanka	
Litsea monopetala	Laureaceae	Asia	
Litsea glutinosa	Laureaceae	Asia & Austalia	
Clidemia hirta	Melastomataceae	América tropical	
Ossaea marginata	Melastomataceae	Brasil	
Pinus elliottii	Pinaceae	América	
Pongamia pinnata	Leguminosae	Asia	
Psidium cattleianum	Myrtaceae	Brasil	
Ravenala madagascariensis	Musaceae	Madagascar	
Rubus alceifolius	Rosaceae	Sureste de Asia	
Rubus rosifolius	Rosaceae	Asia & Austalia	
Schinus terebinthifolius	Anacardiaceae	Brasil	
Spathodea campanulata	Bignoniaceae	Este de África	
Strobilanthes hamiltonianus	Acanthaceae	India	
Syzygium cumini	Myrtaceae	Asia	
Syzygium jambos	Myrtaceae	Sureste de Asia	
Tabebuia pallida	Bignoniaceae	Caribe	
Tecoma stans	Bignoniaceae	África	
Tamarindus indica	Leguminosae	África	
Tibouchina viminea	Melastomataceae	Suramérica	
Terminalia arjuna	Combretaceae	Asia	
Wikstroemia indica	Thymeliaceae	India	

Como material adicional esta disponible una tabla con las plantas nativas de los bosques de Mauricio y su estado de conservación, que puede descargarse en la página web de la revista (http://www.forestales.net), junto a este reportaje.