

Zorro (*Vulpes vulpes*)



Texto: **Enrique García Gómez**
Fotografías: **Foto Ardeidas**

Cola inconfundible

El tamaño de su cola, que llega a ser hasta el 70 % de la longitud del cuerpo, es una característica inconfundible de los zorros, al igual que la terminación de esta en un mechón blanco. Su hocico alargado y puntiagudo también es un rasgo distintivo de la especie. El color del pelo de cada ejemplar es variable, pues oscila desde el negruzco a los pálidos y amarillentos, si bien el más común es el pardo-rojizo.


Carnívoro oportunista

Su elenco alimenticio es amplísimo, adaptándose a los recursos que haya en cada zona. Una de sus presas favoritas es el conejo, aunque en su menú se encuentran multitud de micromamíferos, aves e insectos. Cuando tiene ocasión aprovecha las carroñas que encuentra, tanto de animales salvajes como domésticos.

Además, es un visitante asiduo de los vertederos humanos, donde obtiene buena parte de los alimentos. Las basuras y las carroñas se convierten, en sitios humanizados, en la fuente principal de sus recursos tróficos. Durante el otoño e invierno un porcentaje importante de su dieta se basa en los frutos silvestres.

Abundante y disperso

Se distribuye por casi todo el territorio europeo, excepto en las zonas más al norte. En la península ibérica es común en cualquier lugar, aunque su densidad depende sobre todo de la posibilidad de obtención de alimento. Se puede encontrar en cualquier tipo de hábitat: bosques, zonas de cultivo, zonas semiáridas... De hábitos crepusculares y nocturnos, aunque en zonas poco transitadas por el ser humano no es difícil observarlos durante el día.



Apareamientos y partos

El apareamiento suele suceder entre los meses de enero y febrero, y tras siete semanas y media de gestación se producen los nacimientos. El número de cachorros por camada es muy variable, aunque lo normal es que oscilen entre 2 y 7. Esto depende de aspectos genéticos, de la densidad de población

y de la disponibilidad de alimento.

Los primeros momentos de vida se desarrollan dentro de la madriguera. Las dos primeras semanas sin abrir los ojos y hasta la quinta semana manteniéndose exclusivamente de la leche materna. A partir de ahí las crías diversifican su alimentación y comienzan sus correrías fuera de la madriguera.